

EL PARTO EN LA PERRA

Es difícil predecir el momento de parto, sobre todo si no sabemos la fecha exacta de la cruce. Generalmente la gestación dura 63 días, con un rango de 54 a 66 días. Todo esto es muy relativo, pero si la hembra sobre pasa los 67 días de gestación es bueno prevenir y consultar un médico veterinario.

La última semana de preñez se pueden advertir los cachorros y sus movimientos, sobre todo cuando la madre está echada sobre uno de sus costados. Para entonces ya debemos disponer de un lugar cómodo y cálido para que ella de a luz a su camada.

Para este fin son muy útiles las ampollas de rayos infrarrojos, la temperatura ideal al momento de parto es de unos 30° a 35° C; no debemos olvidar que los cachorros aun no han desarrollado su sistema termorregulador y un clima frío puede matarlos.

Se recomiendan generalmente las cajas de parto, esta deberá tener bordes de 10 centímetros de alto aprox., para que los cachorros no puedan escapar o caerse; o una casa a la que se le pueda levantar el techo para manejarlos.

La cama puede estar compuesta por papeles picados, trapos viejos o aserrín, aunque este último es incómodo sobre todo en razas de pelo largo, ya que el polvillo de la madera se pega, enreda y ensucia el pelo, y la viruta de madera aunque es una excelente cama para perros de más de 2 meses y de pelo corto, no es recomendable ya que corta las almohadillas de los bebés, y las fibras de la madera pueden ser ingeridas por estos.

Lo mejor al momento del parto, según mi experiencia es el papel picado, que puede ser cambiado a medida que nacen los cachorros. Luego se puede poner una cama de esponja, que este cubierta por una manta que se debe cambiar a diario.

Al momento del parto es bueno estar preparado y tener unas tijeras esterilizadas, esto se puede llevar a cabo hirviéndolas por 45mn, luego dejar enfriar el agua y agregar unas gotas de povidona yodada, puede ser muy útil una toalla.

Los primeros signos de parto son:

1. La hembra hace nido, aunque esto puede suceder 1 a 2 semanas antes.
2. La vulva aumenta de tamaño, y elimina una secreción transparente y cristalina.
3. Rechazo del alimento, aunque no siempre sucede.
4. La última semana la hembra puede tener una baja en la temperatura rectal de 38,1°C a 37,5°C esto puede advertirse en la mañana o al anochecer. Pero 48 a 24 horas del parto la

temperatura baja a 37°C, este es el signo más certero de un parto inminente.

Las contracciones indican que el trabajo de parto ha comenzado, estas se pueden visualizar fácilmente. Generalmente los cachorros nacen sin problemas, con intervalos de 2 horas, aunque en camadas grandes pueden ser pocos minutos. En este caso hay que ayudar a la madre a eliminar la membrana que los cubre, rompiéndola en la zona de la nariz, para dar lugar a la respiración. Cuando se presenta un cachorro de pie, generalmente no hay problemas, pero en caso de que la cabeza quede atrapada en el canal de parto, se puede esperar a que se presente la siguiente contracción y ayudar a que salga manipulando al cachorro con 2 o 3 dedos (no olvidar ponerse guantes estériles). En estos casos es bueno avisarle al médico veterinario que el parto se presentará, para disponer de su ayuda rápidamente.

Algunos consejos

Entre un cachorro y otro se le puede ofrecer a la madre algún líquido para beber, como leche tibia con azúcar.

Es bueno que el parto sea presenciado, generalmente las perras se sienten más tranquilas cuando están acompañadas de sus amos (sin tumultos).

Sí la madre no elimina la membrana del cachorro el criador debe hacerlo rápidamente.

El cordón umbilical puede ser pinzado o anudado, para luego cortarlo con 3 cm de longitud.

Se deben contar las placentas, 1 por cachorro, generalmente la madre se la come al nacer el crío.

En caso que no salgan todas las placentas, o que la perra presente fiebre post parto, debe consultar a su médico.

Claudia Nieto Aranda.

draclaudianieto@yahoo.es

(02) 474 70 73 / (09) 991 42 37

Médico Veterinario.