

# GIARDIA VAX



## DESCRIPCION

Vacuna inactivada contra el parásito Giardia lamblia de uso en caninos.

## COMPOSICION

Trofozoitos inactivados de Giardia lamblia:	
---	--

## ACCION

Vacuna contra Giardia lamblia (antígeno inactivado).

## INDICACIONES

Inmunización activa en caninos sanos para prevenir la enfermedad y diseminación causada por la infección provocada por Giardia lamblia.

Inyectar una dosis en perros de 8 semanas. Repetir una segunda dosis 2 a 4 semanas después.

Se recomienda la revacunación anual.

Se recomienda la revacunación anual con una dosis.

## CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS

La giardiasis es una zoonosis que puede producir trastornos gastrointestinales en caninos y humanos. Una vez enfermo el animal, queda expuesto a otras patologías más graves. La infección ocurre a través de quistes que luego se transforman en trofozoítos en el intestino, afectando principalmente al duodeno.

Los trofozoítos evolucionan a quistes infectantes eliminándose por materia fecal.

Es por ello que la higiene adecuada y la vacunación son importantes para proteger la salud del animal y de los humanos. La vacunación ayuda a interrumpir la diseminación de quistes al medio ambiente y por ende la posibilidad de contagio.

Recuerde que la giardiasis es de difícil diagnóstico con las pruebas convencionales de laboratorio, pudiéndose obtener falsos negativos. Frente a una sospecha clínica, se recomienda avisar al laboratorio para que realice la prueba conveniente. Ante la confirmación del diagnóstico, sugiera a su cliente que visite al médico avisando de esta parasitosis en su animal.

Conservar entre 2 y 7°C.

Como con todo medicamento, mantener fuera del alcance de los niños.

### EFFECTOS COLATERALES

Como puede suceder con cualquier producto inyectable, pueden presentarse reacciones de tipo anafiláctico. En este caso, aplicar epinefrina.

### DOSIFICACION

La dosis es de 1 ml por vía subcutánea (SC).

### ESPECIES



### PRESENTACION

Frasco de 1 dosis (1 ml).

### APLICACION

Inyectable

