

## LOS PORQUE DE LAS DIARREAS EN LOS CACHORROS

**C**uando se nos presenta un cuadro de diarrea en un cachorro, debemos saber que hay que tratar de solucionarlo lo antes posible, porque se deshidrata fácilmente, porque bajan sus defensas, porque de inmediato se desmejora su estado general, etc. O sea que un cachorro con diarrea es un verdadero problema.

Esta nota tiene la finalidad de:

Primero, dar una orientación de cómo funciona parte del aparato digestivo, las zonas más involucradas en una diarrea y que entendemos por esta.

Segundo, enumerar las razones más frecuentes de diarrea.

Tercero, y último, detenernos en hacer comentarios de las causas que como criadores podemos evitar.

En caso de diarrea hay dos zonas anatómicamente involucradas, el intestino delgado y el grueso. La función normal del intestino delgado es primariamente la de asimilación de alimento. Este proceso inicia con la digestión del alimento en la luz intestinal favorecida por enzimas, sigue la absorción del nutriente hacia las células de la mucosa intestinal y por último la transferencia del nutriente desde la célula de la mucosa a la sangre. El intestino grueso tiene más que nada dos funciones importantes que son la de absorber agua y electrolitos y la de almacenaje y expulsión periódica de la materia fecal resultante.

Diarrea sería entonces el aumento en las frecuencias de la evacuación intestinal y del contenido de agua de las heces. Hay problemas de diarrea que asientan en el intestino delgado y otros en el intestino grueso. Son muy pocas las excepciones que incluyen a ambos intestinos. Tenemos datos como para saber si el problema se asienta en uno u otro intestino.

Cuando la diarrea proviene del intestino delgado también hay vómitos, mucha dilatación de las ansas intestinales, por lo tanto abdomen dilatado y flatulencia, el animal pierde peso, no hay mucosidad en la materia fecal. Cuando el problema se asienta en el intestino grueso, hay presencia de sangre roja y de mucus en materia fecal, ausencia de pérdida de peso y vómito. Estos datos tomémoslo como algo general, recordemos que hay casos que no son así.

Podemos decir que cuatro son los puntos que se refieren a las razones más comunes de diarreas; los tres primeros los mencionaremos nada más, tanto para orientarnos, saber que puede ser ese problema y que un profesional Médico Veterinario lo solucione. El cuarto punto lo vamos a comentar porque como criadores podemos evitarlo.

1. Enfermedades virósicas y bacterianas. Hay enfermedades virósicas tipo parvovirus, moquillo, hepatitis, que cursan con diarrea de diferente índole. Es importante tener un buen plan de vacunación, un criador por prestigio solamente, no puede darse el lujo de arriesgar la vida de sus cachorros. También hay enfermedades bacterianas como las

producidas por Salmonellas, Escherichia coli o Leptospirosis que desembocan en diarrea.

2. Parásitos. Hay parásitos del intestino delgado y del grueso, están los que viven alimentándose del alimento del animal, los que se alimentan de sangre penetrando con sus potentes bocas a través de la mucosa intestinal y los que viven dentro de las células intestinales alimentándose de ellas y destruyéndolas (protozoarios tipo coccidios o giardias). Todos de una u otra forma irritan y lastiman el tracto intestinal, produciendo en mayor o menor grado de diarrea.

3. Patologías específicas. Como las alteraciones producidas por cuerpos extraños, por tumores, intoxicaciones, etc. Factores que agreden la mucosa intestinal, que producen una absorción defectuosa, que provocan una hipermotilidad, etc.

4. Problemas de origen alimenticio. Así es como llegamos a este cuarto punto que es en definitiva, como criadores, uno de los más importantes. Vamos a detallar cuáles son los factores dietéticos que pueden producir diarrea en un cachorro:

Cambios bruscos de alimento: pensemos que estamos tratando con bebes, los cambios deben ser en forma gradual, si en ese cambio hay diarrea lo suspendemos hasta que haya un tiempo de normalidad. Hay que fijarse de no darles alimentos que produzcan irritación, porque se va a traducir en diarrea. También el hecho de sobrealimentarlos o de glotonería acelera el tránsito intestinal; el alimento en mal estado, si lo llegaren a encontrar, también les puede producir diarrea.

Una diarrea común es la producida por darle al cachorro excesiva lactosa. El comprador principiante de un cachorro, muchas veces piensa que este tiene que tomar cantidades (le leche como si fuese un ternero, oran error. La leche de vaca tiene muchísima más lactosa que la leche de perra. El organismo del cachorro no está preparado para metabolizar mucha cantidad de lactosa; esto hace que se produzca una fermentación, que se traduce en diarrea.

Los cereales que se utilizan en su alimentación fichen estar lo suficientemente cocidos, me refiero fundamentalmente al arroz, polenta, sémola, etc. Deben tener por lo menos 20 minutos de cocción, si no producen en su degradación sustancias que irritan la mucosa intestinal y desencadenan una diarrea.

En el caso de las polentas pre-cocidas que sea por lo menos el tiempo que indica el elaborador. Las harinas con las que se hacen los alimentos balanceados también tienen que tener urca intensa cocción, este proceso a veces hace la diferencia entre un balanceado y otro.

Si el cachorro ingiere un exceso de fibra también se puede producir una diarrea. Es importante que en toda dicta exista un determinado porcentaje de fibra, esto favorece ayudando al tránsito intestinal, evitando que se formen bolos fecales o haya constipación. Sólo una pequeña parte de la fibra que va en la ingesta se digiere y asimila, el resto se elimina. Cuando es mucho ese resto, aumenta el peristaltismo intestinal y se produce diarrea.

El aparato digestivo del cachorro es delicado y tiene que asimilar paulatinamente el pasaje de un alimento a otro. De la leche materna tiene que aprender a comer, desde los 15 a 20 días (le nacidos aprende a asimilar el alimento que le damos. Desde los 30 a los 45 días se produce el destete. Recordarnos que la sobrealimentación también puede producir diarrea, así como la alimentación infrecuente.

Es importante cuando se entrega un cachorro, aclararle al nuevo propietario, que estaba comiendo, en que horarios, cuantas veces al día, resaltar como se le daba el alimento o mezcla de alimentos, los porcentajes, etc. Son todos detalles importantes para que el cachorro no sufra tanto esa primera semana, 10 días de adaptación en su nueva casa.

No agregarle otra razón a la posibilidad de que se descompense de alguna forma, una de esas formas es con una diarrea.

Tengamos a nuestros cachorros sanos, que estén bien vacunados y desparasitados, en un ambiente limpio y aireado, eliminemos todos los porque.

**Dr. Mario Daniel Rocca**  
**MEDICO VETERINARIO especialista en pequeños animales**  
**LICENCIADO EN SANIDAD ANIMAL**  
**CRIADOR DE OVEJEROS ALEMANES**